

# Комбикорм для кроликов на откорме «Универсальный»

(код 9206)

## Описание

Сбалансированный универсальный корм для кроликов: крольчат после отъема, лактирующих и сукрольных кроликоматок

- Полностью обеспечивает потребность кроликов в витаминах, макро- и микроэлементах;
- Обеспечивает высокие производительные результаты — оптимальный рост и сохранность кроликов.

## Результат

- **Кролики на откорме:** живая масса до 2,6 кг — к 90 дню выращивания по программе Purina® — при коэффициенте кормоконверсии 4;
- **Лактирующие и сукрольные кроликоматки:** до 50 крольчат на голову — в год при соблюдении программы Purina®.

## Преимущества

- **При кормлении кроликоматок**
  - > Высокая молочность и сохранность крольчат;
  - > Высокие последующие темпы роста крольчат;
  - > Хорошая кондиция, быстрый приход в охоту;
  - > Высокое количество окролов и отнятых крольчат на кроликоматку в год (до 50).
- **При выращивании кроликов**
  - > Здоровый быстрый рост;
  - > Низкий расход корма и конверсия (до 4);
  - > Зрелое вкусное мясо и отсутствие лишнего жира;
  - > Профилактика кокцидиоза.

## Схема кормления

	Период кормления	Потребление комбикорма
Лактирующие матки и крольчата до отъема	0-35 день после окрота	волю
Сукрольные кроликоматки	окрол-отъем	200-350 г/сутки
Кролики после отъема	36-70 день	75-150 г/сутки, ограниченно, средне-суточный привес не более 42 г/сутки
Кролики на откорме	от 71 дня до убоя	волю, 150-200 г/сутки

## Рекомендации при первом скармливании корма

Для начала кормления универсальным комбикормом Purina® рекомендуется переходный период: 5 дней с постепенным вводом корма по схеме:

- 1-й день:** прежний корм и новый Purina® смешиваются в соотношении 80% и 20%;
- 2-й день:** 60% и 40%;
- 3-й день:** 50% и 50%;
- 4-й день:** 40% и 60%;
- 5-й день:** 20% и 80%.

## Состав

Зерновые, шрот подсолнечный, мука травяная, отруби пшеничные, жом свекловичный, масло растительное, мука известняковая, фосфаты, аминокислоты, витамины, минералы, пробиотик, закрепитель гранулы, кокцидиостатик и другие ингредиенты.

## Рекомендации по убоя

За 7-10 дней до убоя постепенно перевести кроликов на ячмень или овес для выведения из организма кокцидиостатика.

## Срок хранения

6 месяцев с даты изготовления.